

Überörtliche Gemeinschaftspraxis

Dr. med. Susanne Wohlers
Prof. Dr. med. Peter Bielfeld
Najib N. R. Nassar
Dr. med. Nora Holtmann

Fachärzte für Frauenheilkunde und Geburtshilfe,
gyn. Endokrinologie und Reproduktionsmedizin

Hauptbetriebsstätte:

Akazienallee 8-12, 45127 Essen

Fon: 0201. 29 4 29-0 Fax: 0201. 29 4 29-14

Nebenbetriebsstätte:

Friedrich-Wilhelm-Straße 71, 47051 Duisburg

Fon: 0203. 71 39 58-0 Fax: 0203 / 71 39 58-15

info@ivfzentrum.dewww.ivfzentrum.de

Patienteninformation zur Vorbereitung der Injektion

1. Plastikspritze auspacken
2. grüne Nadel auspacken und auf die Spritze setzen
3. mit einem Taschentuch die Spitze der Ampulle mit dem Lösungsmittel abbrechen
4. mit der Spritze die Flüssigkeit aufziehen
5. mit einem Taschentuch die Spitze der Pulverampulle abbrechen
6. mit der Spritze die Flüssigkeit hinein spritzen
7. warten, bis sich das Pulver in der Flüssigkeit aufgelöst hat
8. mit der Spritze wieder die Flüssigkeit aufziehen
9. grüne Kanüle abnehmen
10. braune Kanüle auspacken und auf die Spritze setzen
11. Klopfen, bzw. soweit drücken, bis keine Luft mehr in der Kanüle ist (Nadelspitze nach oben halten)
12. in die Bauchfalte spritzen

Nach Anweisung der Ärzte, bzw. dem Spritzenplan entsprechend :

z.B. Brevactid, Predalon, Pregnyl

5.000 I.E. = 1 x Pulver mit 1 x Wasser mischen

10.000 I.E. = 2 x Pulver mit 1 x Wasser mischen

z.B. Menogon HP, Menopur, Bravelle

75 I.E. = 1 x Pulver mit 1 x Wasser mischen

150 I.E. = 2 x Pulver mit 1 x Wasser mischen

225 I.E. = 3 x Pulver mit 1 x Wasser mischen

300 I.E. = 4 x Pulver mit 2 x Wasser mischen